

DETECTAR AS ALTERAÇÕES POSTURAIS EM ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 9 A 12 ANOS

MORESCHI, Daniela Aparecida

MOTA, Jociely Parrilha

SAPATA, Renata Négri - PIC

Acadêmicas do Curso de Fisioterapia das Faculdades Integradas de Maringá - Faimar do Centro de Ensino Superior de Maringá - Cesumar

IGNACHEWSKI, Lucienne Eloise Rocha (Orientador)

Docente do Curso de Fisioterapia das Faculdades Integradas de Maringá - Faimar do Centro de Ensino Superior de Maringá - Cesumar

A realização dessa pesquisa proporcionará a observação das alterações posturais mais freqüentes nos adolescentes com a faixa etária de 9 a 12 anos. São elas: Cifose: É uma curva de convexidade posterior no plano sagital da coluna vertebral. Considera-se cifose patológica quando a angulação for superior a 45° medida pelo método de Cobb-Lippman visto no exame radiológico. Habitualmente encontrada na região torácica. Escoliose: Consiste em rotação da coluna em torno do eixo longitudinal e em desvio no plano frontal, superior a 10° , habitualmente na região torácico ou lombar. Hiperlordose: É o aumento anormal da curva lombar levando a uma acentuação da lordose lombar normal. Determinar quais alterações são mais freqüentes neste grupo de estudos e orientar os pais destes alunos a procurar tratamento precoce para estas alterações evitando sua progressão. Foram realizadas revisões bibliográficas através de livros, revistas e periódicos, para obtermos um levantamento teórico sobre as alterações posturais em adolescentes. Será realizada avaliação postural dos alunos da 4ª série da Escola Municipal Mirian Leila Palandri.

PIC - FAIMAR/CESUMAR

e-mail: renatanegri@zipmail.com.br